



TAKHZYRO®

lanadelumab

solución para inyección 300 mg

Impacto del AEH - Angiodema hereditario en el trastorno gastrointestinal

El dolor abdominal ocurre en hasta el

93% de los pacientes con **AEH**.



El AEH es una patología que se presenta con síntomas en diversos órganos.




- Debido a su rareza y a la superposición de los síntomas con otras afecciones, el **AEH** suele ser poco reconocido y diagnosticado erróneamente. El solapamiento entre el **AEH** y otras enfermedades debe tenerse en cuenta a la hora de reconocer a los pacientes con **AEH**.¹⁻³
- El dolor abdominal ocurre en hasta el **93%** de los pacientes con **AEH**.
- El **AEH** se puede diferenciar de otras causas de dolor abdominal en la etapa diagnóstica mediante una cuidadosa anamnesis.



Debe tenerse en cuenta el solapamiento entre AEH y otras enfermedades a la hora de reconocer pacientes con AEH.

Trastornos gastrointestinales que se solapan a los síntomas abdominales del AEH.¹



Enfermedad celíaca

Enfermedad de Crohn

Colitis ulcerosa

Síndrome del intestino irritable

Dispepsia funcional

Obstrucción del intestino delgado

Migrañas con componente abdominal

En pacientes que experimentan síntomas gastrointestinales sin una inflamación característica de la piel, es posible que se pase por alto la superposición entre AEH y trastornos gastrointestinales.


AEH, Angioedema Hereditario.

1. Staller K, et al. J Clin Gastroenterol. 2022;56:740-747.



El dolor abdominal ocurre hasta en el 93% de los pacientes con AEH¹⁻³

En un estudio de 2014, de pacientes con AEH que experimentaron ataques con algún síntoma abdominal:



El diagnóstico diferencial de AEH puede reducir significativamente la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes

Síntomas asociados con ataques abdominales¹



Síntomas	Ataques con algún síntoma abdominal, (n=154)
Distensión	77%
Calambres	73%
Náuseas	67%
Vómitos	21-73% ¹
Diarrea	14-41% ¹

El diagnóstico diferencial de AEH puede reducir significativamente la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes



El AEH se puede diferenciar de otras causas de dolor abdominal en la etapa de diagnóstico mediante la realización de exámenes físicos¹



- El dolor abdominal en el **AEH** a menudo se describe como **calambres, cólicos, cansancio o agotamiento**.
- Los pacientes pueden tener **distensión abdominal, dolor a la palpación durante un ataque**.
- Los profesionales de la salud deben considerar el **AEH** en pacientes con **dolor abdominal intenso**, incluso en ausencia de antecedentes de **inflamación laríngea o cutánea**.

Conectar el dolor abdominal recurrente con los síntomas cutáneos recurrentes es una pista clínica importante en el diagnóstico de AEH ya que, a lo largo de la vida, **es muy poco probable que una persona tenga dolor abdominal sin síntomas cutáneos en cada episodio**.



Para la prevención del AEH

TAKHZYRO® está indicado para la prevención rutinaria de las crisis recurrentes de angioedema hereditario (AEH) en pacientes a partir de los 12 años.



1 ÚNICA INYECCIÓN
SUBCUTÁNEA¹



CADA **2** SEMANAS¹

3

OPCIONES
PARA SITIOS
DE INFUSIÓN

Abdomen, Brazo o Muslo¹



DOSIS INICIAL RECOMENDADA DE 300 MG CADA 2 SEMANAS



TAKHZYRO[®]

lanadelumab
solución para inyección 300 mg



TAKEDA CHILE SPA
Eliodoro Yañez 2990, Oficina 3 A 1
Providencia, Santiago

Material de uso exclusivo para profesionales de la salud habilitados a prescribir.
Prohibida su distribución al público general.
C-APROM/CL/TAKH/0021 – Mayo 2024

TAKHZYRO (LANADELUMAB)
Solución para inyección 300 mg.
Folleto de información al profesional en el QR

